


# Tæger



Tægerne tilhører, sammen med bl.a. bladlus og cikader, ordenen af næbmundede i insekt-klas-sen. Næbmunde er nok ikke det bedste navn til gruppen, da de bestemt ikke har næb som fuglene men i stedet en mund, der er omdannet til en stikkende sugesnabel.

Ikke mindre end 557 arter optræder på listen over danske tæger, der rummer både vandtæger, damtæger og landtæger.

Tæger er klart den artsrigeste gruppe af næbmunde - skarpt forfulgt af bladlus.

## Ligheder

Hos alle tægerne ses sugesnablen tydeligt under maven. Den ses også, når tægen er i gang med at suge plantesafter eller safter fra andre dyr, som de æder. Det kan fx være sommerfuglelarver. Tægerne kendes desuden på, at dækvingerne, der beskytter flyvevingerne, er delt op i to dele, hvor den forreste del er læderagtig, mens den yderste del er hindeagtig og ofte mere eller mindre gennemsigtig. Når vingerne er foldet sammen, danner de et X på ryggen af tægen.

Endelig har næsten alle tæger en stor trekant bag brystet, så det ser ud som om, at de har spejdertørklæde på. Alle tæger har seks ben ligesom andre insekter, og de har ufuldstændig forvandling. Det vil sige, at når tægens æg klækker, så ligner ungerne den voksne en lille smule og kaldes for nymfer. Når ungerne vokser skifer de hud flere gange, og kommer for hvert hudskifte til at ligne det voksne dyr mere og mere.



Grøn bredtæge, nymfe  
Foto Leif H. Sørensen



Grøn bredtæge  
Foto Leif H. Sørensen

## Forvekslingsmuligheder

Tægerne forveksles ofte med billerne, men billerne har bidende munddele, og dækvingerne er hårde og uigennemsigtige over det hele.

I daglig tale forveksles tægerne også med skovflåten, som suger blod på hunde, katte og andre dyr, og som vi kan finde på os selv, hvis vi har været en tur i skoven. Skovflåten har dog helt andre munddele, og har otte ben og er derfor ikke et insekt. Men mange kalder den stadig for en tæge, måske fordi man på apoteket kan købe en tægetang til at fjerne flåter med! Det burde jo nok hedde en flåttang.



Skovflåt (mide) med blod  
Foto Leif H. Sørensen



Skovflåt (mide)  
Foto Naturhistorisk Museum Aarhus


## Super sejt!

Tægerne er rigtig godt tilpasset mange forskellige levesteder, og de kan se ret forskellige ud. Tænk bare på skøjteløber, stavtæger, bug-og rygsvømmer, bredtæger, skorpiontæge, blomstertæger, frøtæger for blot at nævne nogle.

Selv om nogle af tægerne helst vil leve i vand, så kan de stadig bruge deres vinger og vælge at flyve over til en anden sø.



Firpletet-blomstertæge  
Foto Naturhistorisk Museum Aarhus





Vandrøver  
Foto Michael Winther

**Vandrøver** har et imponerende stik i forhold til sin størrelse, og det kan virkelig gøre nas at blive stukket. Nogen siger, at det er værre end at blive stukket af en hveps. Så pas på med at klemme den i hånden, hvis du fanger en!



Birketæge med æg  
Foto Leif H. Sørensen

**Almindelig birketæge** er et af de få insekter, der passer deres unger. Hunnen samler nymferne i en klump på et birkeblad og sætter sig oven på dem for at passe på dem og forsvare dem mod rovdyr.



Grøn bredtæge, nymfe  
Foto Leif H. Sørensen

**Grøn Bredtæge** hører til bredtægerne, som udgør en stor gruppe af tægerne. Flere af dem kan udskille et stof, der smager og lugter forfærdeligt. På svensk hedder de derfor bärffisar, da de ikke er rare af få med i spanden, når man plukker bær.



Skøjteløber  
Foto Michael Winther

**Skøjteløberen** har to korte og fire lange ben, der kan hjælpe den med at opnå en fart på op til 1,2 meter i sekundet, når den skøjter hen over overfladen for at fange små insekter. Det svarer til 4,32 km i timen og er en meget høj fart for så lille et dyr. Det svarer til, at du kunne skøjte på vandet med over 300 km/timen!



Stavtæge  
Foto Michael Winther

**Stavtægen** er et af Danmarks længste insekter og kan blive helt op til 7 cm lang. Samtidig er den en sand mester i camouflage og er meget svær at få øje på, når den gemmer sig mellem siv og andre planter i vandet. Stavtægen kan et megasejt trick: hvis den mister ét af sine ben, vokser et helt nyt ben ud.



Skorpionstæger  
Foto Leif H. Sørensen

**Skorpionstægen** og stavtægen har et langt ånderør i bagenden, som de bruger som snorkel. De kan på den måde sidde stille i meget lang tid på en plantestængel eller lignende under vandet og stadig trække vejret. Her venter de på, at et byttedyr kommer forbi, som de snupper med deres imponerende "fangarme".




Soldatertæge  
Foto Naturhistorisk Museum Aarhus



Ildtæge  
Lenette Schunck



Rød kanttæge  
Foto Leif H. Sørensen



Stribetæge  
Foto Naturhistorisk Museum Aarhus

**Soldatertæge, ildtæge, rød kanttæge og stribetæge** er som mariehønen helt røde og sorte, og ret seje. Med de kraftige farver signalerer de til andre dyr: "Der er ingen grund til at prøve at æde os, vi smager alligevel forfærdeligt". Derfor ser man ofte stribetægen sidde frit fremme. Den har en stor selvtillid og en tro på, at den ser så sej ud, at ingen får lyst til at æde den. Kan I se forskel på soldatertægen, ildtægen og den røde kanttæge?

